

ПИТАНИЕ ГЛУХАРЯ ОБЫКНОВЕННОГО

Худяков В.В.

Архангельский государственный университет

Питание глухаря, обитающего в подзоне средней тайги, определяли по данным анализа зобов птиц добытых в весенний (май) и осенний (сентябрь-октябрь) период.

Было установлено, что основой питания глухаря в сентябре и октябре являются ягодные кустарнички, преимущественно черника. Именно это растение вместе с ягодами составляет третью часть рациона (36,2%). После наступления зимы птицы питаются этими растениями до тех пор, пока они полностью не покроются снегом. В начале зимы глухарь собирает их под кронами деревьев, под валежником и в других малоснежных и свободных от снега местах.

На втором месте в питании птиц в осенний период находится сосновая хвоя, которую глухари начинают склевывать уже в октябре (18,3%), а несколько раньше в августе и начале сентября, птицы питаются листьями осины (5,6%). Ягодные корма играют в питании глухаря заметную роль, ягоды брусники занимают 8,4%, клюквы 2,8%, голубики 2,6%, малины 1,6%. Однако необходимо отметить, что их количество в рационе всецело зависит от урожайности. В урожайные годы в рационе глухаря встречаются ягоды рябины 3,4%, плоды шиповника 4,1%.

На зимние корма глухарь переходит в течение октября и ноября, а с декабря единственным кормом его становится сосновая хвоя. В этот период птицы разнообразят рацион, поедая хвою ели (0,4%), шишкоягоды и хвою можжевельника (1,4%), семена трав и спорангии мхов (2,4%), сережки березы (1,4%), а также вегетативные органы трав (11,4%). Эти корма содержат много сахара и витаминов и имеют важное кормовое значение. Специфические корма переходного периода в известной мере определяют характер размещения птиц по территории, поскольку произрастание указанных растений приурочено к определенным элементам ландшафта.

Основным источником корма глухаря в зимний период является сосновая хвоя, при этом птицы употребляют хвою не всякого дерева, а только определенных – так называемых кормовых сосен. Следует отметить, что при выборе кормового дерева, глухарь отдает предпочтение угнетенным деревьям, что выражается в меньших размерах деревьев в данном возрасте, располагающихся во втором ярусе. В пищу, глухарь употребляет хвою первого и второго года, а хвою старших возрастов только в исключительных случаях.

Основным кормом глухаря в весенний период является хвоя сосны – 26,2%. Зеленые стебли и почки черники занимают в рационе – 18%, соцветия пушицы и листья багульника 11,6 и 14,4% соответственно, клюква – 9,3%, листья трав и перезимовавшие ягоды брусники – соответственно 7,8 и 5,6%. Встречается также хвоя ели (3,6%) и листья древесных пород (3,5%).